

適用拡大農薬

関西グリーン研究所 製

注：登録内容を一部変更して記載している場合があります。(例：200L/10a→200ml/m<sup>2</sup>)  
 注：使用に際しては取扱説明書で内容をご確認ください。  
 注：魚毒性については取扱説明書の注意書きをご確認ください。

2013.3.16～2013.6.31

変更(追加)部分は斜体・太字

農薬	商品名 (種類名)	対象芝草	使用回数 使用時期	使用方法	申請業者	毒性
	有効成分(%)	対象病害虫・雑草 使用目的		希釈倍数・薬量 水量		
除草剤	ウェイアップアクアキャップ (N ジェイ イタリイマイ助ア 除草剤)	ククタイブ ルグ ス 一年生雑草 (キク科を除く)	3回以内 芝生育期 (雑草発生前)	全面土壌散布 0.4-0.6ml/m <sup>2</sup> 200-300ml/m <sup>2</sup>	BASF ジャパン	普
	ペンティメタリン (38.7)	のしば		全面土壌散布 0.2-0.4ml/m <sup>2</sup> 200-300ml/m <sup>2</sup>		
	シバッチ乳剤 (S-メトラクロール乳剤)	一年生雑草	3回以内 秋冬期雑草発生前 (芝生育期)	全面土壌散布 0.2-0.4ml/m <sup>2</sup> 200-300ml/m <sup>2</sup>	シンジェンタ ジャパン	普
	S-メトラクロール (83.7)	こらいしば				
	ダコグリーン顆粒水和剤 チウラム・TPN水和剤	藻類	8回以内 芝生育期 (藻類発生前)	散布 2g/m <sup>2</sup> 500ml/m <sup>2</sup>	I&I・I&I 伊藤 クミアイ化学工業 住化グリーン	普
	チウラム (30.0)・TPN (50.0)	日本芝				
殺菌剤	シバンバEXフロアブル (PV キリスロピル・メチコジニル水和剤)	ダラス病	4回以内 発病初期	散布 333-400倍 200ml/m <sup>2</sup>	シンジェンタ ジャパン	普
	アブキスロピル (9.2)・メチコジニル (6.7)	ククタイブ ルグ ス				
	ミックレート水和剤 (E1 200000000 -1・7 DC 3000 -4水和剤)	雪隠小粒菌核病	2回以内 根雪前	散布 200-400倍 200ml/m <sup>2</sup>	ホクサン	普
	E1 200000000 -4 (25.0)・7 DC 3000 -4 (12.5)					